

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP -5-11-60 018338

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

ABONNEMENT ANNUEL

(Tél. 72-58-72)

12 NF

(AUDE, AVEYRON, GARD, HÉRAULT, LOZÈRE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 16, rue de la République - MONTPELLIER.

C. C. P. : MONTPELLIER 5.238-57

Supplément n° 1 au
numéro 1 du 3/10/60

INFORMATIONS

CLOQUE du PECHER - Si les arboriculteurs connaissent trop bien les dégâts imputables à ce champignon (feuilles rougies, durcies et déformées ; rameaux déformés) ils méconnaissent trop souvent l'intérêt d'un traitement d'automne, réalisé dès la chute des feuilles. La bouillie bordelaise à 2 % est efficace, ainsi que les produits cupriques très adhérents.

CORYNEUM - Maladie du pêcher, de l'abricotier et du cerisier : Le Coryneum provoque la criblure du feuillage. Les taches rouges puis brun noirâtre se dessèchent et se détachent perforant le limbe. La chute prématurée du feuillage peut suivre.

Sur rameaux des taches semblables peuvent se produire évoluant en lésions semblables à des chancres et pouvant provoquer des exsudations de gomme. Si ces lésions se développent à la base des bourgeons, ceux-ci peuvent être détruits.

Sur fruits, l'attaque provoque la chute prématurée ou bien sur les fruits subsistants des taches rougeâtres arrondies qui persistent (fréquentes sur abricots).

Très résistant au froid, le Coryneum évolue pendant tout l'hiver, l'humidité lui est très favorable. Les traitements d'automne sont indispensables pour limiter les infections se produisant à cette époque par les plaies consécutives à la chute des feuilles. Les traitements "lavés" par les pluies seront renouvelés.

Les bouillies cupriques sont efficaces contre le Coryneum, mais peuvent produire des brûlures sur les bois mal aoûtés. Si l'on doit traiter tôt en saison, on préférera les produits fongicides de synthèse réservant l'usage des bouillies cupriques pour les traitements ultérieurs (après les premières gelées).

Le FUSICOCUM est une maladie du pêcher très peu répandue dans notre région. La contamination automnale par les plaies d'insertion des feuilles semble fréquente, provoquant un chancre autour des bourgeons et le flétrissement des rameaux.

Il faut traiter à l'automne. Le traitement cuprique ou organique destiné à combattre le Coryneum sera efficace contre le Fusicoccum.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux,

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles,

P. BERVILLE

L. L. TROUILLON

P348

Imprimerie de la Station Languedoc-Roussillon. Directeur-gérant : L. BOUYX